

## Rapport beitetaksering elg 2004 - 2009 i Lardal

For 5. gang på 6 år har Ole Adolf Eide foretatt beitetaksering i kommunen sammen med representanter fra de forskjellige driftsplanområdene.

Bakgrunnen for takseringene er at en ønsker et bedre grunnlag for å forvalte elgstammen så riktig som mulig.

En slik overvåkingstakst gir grunnlag for å følge beitepresset over tid.

Etter en reduksjon i beitegrad fra ca. 2,0 til ca 1,5 i gj.snitt for hele kommunen for ROS-artene (Rogn,Osp,Selje) fra 2006 til 2007, valgte vi å sløyfe takst i 2008.

Taksten i år viser (dessverre) at gj.snittlig beitegrad er økt til ca 2,0 igjen. Det er på nåværende tidspunkt **ikke ønskelig** med en økning i beitegrad, men det samsvarer godt med en registrert økning i sett elg/jegerdagsverk på ca **30%** fra 2008 til 2009.

Det lille positive med årets takst er at antall beiteplanter mellom 0,6 og 4,0 meter har økt med 16% og plantehøyden har økt med 19% til 11,4 dm for ROS-artene. Denne økningen er derimot for en stor del en naturlig utvikling all den tid vi stort sett har holdt oss på de samme flatene.

Konklusjonen synes å være at det fortsatt er riktig å ta ut minst tilveksten i stammen. Det betyr sannsynligvis at vi må øke avskytingen noe i forhold til i fjor. Et forsiktig anslag er en økning på 10%, men det anbefales at hvert jaktlag vurderer situasjonen etter de første ukene i jakten for eventuelt å øke avskytingen ytterligere. Så lenge vi klarer å ta ut mye kalv/ungdyr/nedklassifiserte dyr, samtidig som vi prøver å være forsiktige med å ta ut store voksne dyr, er det liten fare for at vi skyter for hardt. Etter 2 år i inneværende planperiode har vi tatt ut 58 % kalv/ungdyr (65 % inkl. nedklassifisering) Dette er en svært bra ungdyrprosent tatt i betraktning den dårlige produksjonen vi i dag har i elgstammen vår, og støtter opp om at vi sannsynligvis beskatter for lavt.

Med i vurderingen av jakttrykket må også tas at en større del av avvirkingen de senere årene har foregått på superboniteter under marin grense, noe som skaper adskillig mindre tilgjengelig elgmat enn om samme kubikkmasse hadde blitt hogd "på skauen" på midlere boniteter.